



TÜVRheinland®
Precisely Right.

杜夫萊茵股份有限公司高雄實驗室
TÜV Rheinland AIMEX Ltd. Kaohsiung Lab

檢測報告
TEST REPORT

報告編號 *Report Number* : 15-1202-037-03

申請單位 Applicant: 杜夫萊茵股份有限公司

聯絡電話 Tel: 07-8317000 ext.100

傳真電話 Fax: 07-8313848

申請單位地址 *Applicant Address*: 806 高雄市前鎮區南七路3號3樓

檢驗日期 *Test Period* : 2015/12/02 ~ 2015/12/14

送樣日期 *Date Received*: 2015/12/02

樣品名稱 Sample Name: 蟬花虫草純粉

產品資訊 Sample Info：生產日期:2015.05.18

報告日期 *Date Issued*: 2015/12/14

檢測項目 Item(s)	結果 Result(s)	備註 Remark(s)
西藥成分 188 項 Western medicine (188)	陰性 (未檢出)	細目如附件
~~~~~以下空白~~~~~		

~~~以下空白~~~

检测方法：

以高效能液相層析儀(High Performance Liquid Chromatography)分析。

樣品照片：



報告簽署人



1.本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

2. 檢測結果僅對檢測樣品有效。

3. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。

4.本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。

9.檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。

5.本報告經塗改者無效。

6.結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。

7.結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。

8.本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢驗檢體負責。

實驗室地址: 80681 高雄市前鎮區南七路 3 號 3 樓 TEL:(07)8317000, FAX:(07)8313848

第1頁，共1頁

西藥成分188項 Western medicine (188)

(附件)

| 序號 | 分析項目 | M.D.L.
(mg/g) | 序號 | 分析項目 | M.D.L.
(mg/g) |
|-----------|---|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| 類固醇：(9) | | | 麻藥拮抗劑：(2) | | |
| 1 | Betamethasone (倍他米松) | 2 | 27 | Naloxone (納洛酮) | 0.25 |
| 2 | Cortisone acetate (醋酸可的松) | 1 | 28 | Naltrexone (納曲酮) | 0.25 |
| 3 | Dexamethasone (地塞米松) | 1 | 利尿劑：(8) | | |
| 4 | Hydrocortisone (氫化可的松) | 1 | 29 | Chlorothiazide (氯噻嗪) | 0.2 |
| 5 | (氫化可的松-21-醋酸酯)
Hydrocortisone-21-Acetate | 1 | 30 | Furosemide (呋塞米) | 0.25 |
| 6 | (甲基強的松龍)
Methylprednisolone | 0.5 | 31 | Hydrochlorothiazide (氫氯噻嗪) | 0.6 |
| 7 | Prednisolone (泼尼松龍) | 0.5 | 32 | Spironolactone (螺內酯) | 1 |
| 8 | Prednisone (泼尼松) | 0.2 | 33 | Acetazolamide (乙酰唑胺) | 10 |
| 9 | (曲安奈德)
Triamcinolone acetonide | 1 | 34 | Metolazone (美托拉宗) | 1.75 |
| 降血脂類：(3) | | | 35 | Triamterene (氯苯蝶啶) | 0.875 |
| 10 | Benzafibrate (苯扎貝特) | 0.06 | 36 | Indapamide (吲達帕胺) | 0.75 |
| 11 | Clofibrate (降固醇酸) | 0.06 | 抗生素：(30) | | |
| 12 | Gemfibrozil (二甲苯氧庚酸) | 0.07 | 37 | Amoxycillin trihydrate (阿莫西林三水) | 1 |
| 荷爾蒙類：(14) | | | 38 | Ampicillin trihydrate (氨苄青霉素三水) | 0.8 |
| 13 | (17 α -乙炔基雌二)
17 α -Ethinylestradiol | 0.16 | 39 | Chloramphenicol (氯霉素) | 0.3 |
| 14 | (3,3,5-碘狀腺游離酸)
3,3,5-Triiodothyronine free acid | 0.45 | 40 | Chlortetracycline (金霉素) | 0.8 |
| 15 | Carbimazole (卡比馬唑) | 0.5 | 41 | Erythromycin estolate (无味紅霉素) | 3.2 |
| 16 | Diethylstilbestrol (己烯雌酚) | 1 | 42 | Fluconazole (氟康唑) | 0.4 |
| 17 | Estradiol benzoate (苯甲酸雌二醇) | 1 | 43 | Griseofulvin (灰黃霉素) | 0.3 |
| 18 | Estriol (雌激素三醇) | 0.25 | 44 | Isoniazid (异烟肼) | 0.25 |
| 19 | Estrone (雌激素酮) | 0.25 | 45 | Metronidazole (甲硝唑) | 1 |
| 20 | Methyltestosterone (甲睾酮) | 3 | 46 | Nalidixic acid (萘啶酸) | 1 |
| 21 | Progesterone (孕酮) | 2.5 | 47 | Nitrofurantoin (呋喃妥英) | 1 |
| 22 | Testosterone propionate (丙酸睾酮) | 4 | 48 | Nitrofurazone (呋喃西林) | 1 |
| 23 | Danazol (达那唑) | 7.5 | 49 | Norfloxacin (诺氟沙星) | 1 |
| 24 | (克羅米酚檸檬酸盐)
Clomiphene Citrate | 2.5 | 50 | Oxolinic acid (恶喹酸) | 1 |
| 25 | (乙炔雄二醇)
Ethinyl-Androstenediol | 7.5 | 51 | Phenazopyridine (非那吡啶) | 1 |
| 26 | Formestane (福美坦) | 15 | 52 | Rifampicin (利福平) | 0.8 |

西藥成分188項 Western medicine (188)

(附件)

| 序號 | 分析項目 | M.D.L.
(mg/g) | 序號 | 分析項目 | M.D.L.
(mg/g) |
|-----------|------------------------------------|------------------|-----------|---|------------------|
| 53 | Sulfadiazine (磺胺嘧啶) | 1 | 80 | Ketotifen Fumarate (富馬酸酮替芬) | 0.25 |
| 54 | Sulfadimethoxine (磺胺二甲氧嘧啶) | 0.3 | 81 | Tripolidine (曲普利啶) | 0.5 |
| 55 | Sulfaguanidine (磺胺脒) | 0.5 | 腸胃類：(11) | | |
| 56 | Sulfamerazine (磺胺甲基嘧啶) | 0.4 | 82 | Atropine (阿托品) | 0.4 |
| 57 | Sulfamethazine (磺胺二甲嘧啶) | 0.45 | 83 | Bisacodyl (比沙可啶) | 0.4 |
| 58 | Sulfamethizole (磺胺甲二唑) | 0.3 | 84 | Buscopan (scopolamine n-butylbromide) (解痉灵) | 1 |
| 59 | Sulfamethoxazole (磺胺甲惡唑) | 0.2 | 85 | Camylofine (卡米羅芬) | 1 |
| 60 | Sulfamethoxypyridazine (磺胺甲氧吡嗪) | 0.4 | 86 | Cimetidine (甲腈咪胺) | 0.4 |
| 61 | Sulfanilamide (磺胺) | 0.4 | 87 | DL-Homatropine (氫溴酸后馬托品) | 0.4 |
| 62 | Sulfathiazole (磺胺噻唑) | 0.5 | 88 | Ethaverine (乙基罌粟碱) | 0.3 |
| 63 | Sulfisomidine (磺胺二甲氧嘧啶) | 1 | 89 | Flopropione (三羥苯丙酮) | 0.3 |
| 64 | Sulfisoxazole (磺胺異惡唑) | 1 | 90 | Metoclopramide (甲氧氯普胺) | 0.6 |
| 65 | Tetracycline HCl (鹽酸四環素) | 0.8 | 91 | Oxyphencyclimine (羟苺利明) | 1 |
| 66 | Trimethoprim (甲氧苄氨嘧啶) | 0.2 | 92 | Propantheline bromide (溴丙胺太林) | 0.4 |
| 糖尿病用藥：(7) | | | 精神科類：(13) | | |
| 67 | Acetohexamide (醋磺環己脲) | 0.5 | 93 | Chlormezanone (氯美扎酮) | 0.13 |
| 68 | Chlorpropamide (氯磺丙脲) | 0.25 | 94 | Chlorpromazine HCl (鹽酸氯丙嗪) | 0.25 |
| 69 | Glybenclamide (格列本脲) | 0.25 | 95 | Clordiazepoxide HCl (鹽酸氯氣卓) | 0.25 |
| 70 | Metformin (二甲雙胍) | 0.5 | 96 | Diazepam (安定) | 0.25 |
| 71 | Phenformin hydrochloride (鹽酸苯乙雙胍) | 0.5 | 97 | Diphenylhydantoin (苯妥英) | 0.13 |
| 72 | Tolazamide (甲磺氯草脲) | 0.13 | 98 | Flunitrazepam (FM2) (氯硝西洋) | 0.16 |
| 73 | Tolbutamide (甲苯磺丁脲) | 0.25 | 99 | Fluoxetine (氟西汀) | 0.5 |
| 抗組織胺類：(8) | | | 100 | Meprobamate (氯甲丙二酯) | 10 |
| 74 | Brompheniramine maleate (馬來酸溴苯那敏) | 0.13 | 101 | Oxazolam (惡唑) | 2 |
| 75 | Carbinoxamine maleate (馬來酸氯苯吡醇胺) | 0.13 | 102 | Phenobarbital (苯巴比妥) | 0.25 |
| 76 | Chlorpheniramine maleate (馬來酸氯苯吡胺) | 0.5 | 103 | Primidone (扑米酮) | 0.25 |
| 77 | Cinnarizine (桂利嗪) | 0.13 | 104 | Sulpiride (舒必利) | 1 |
| 78 | Diphenhydramine (苯海拉明) | 0.53 | 105 | Thioridazine (硫利達嗪) | 0.5 |
| 79 | Diphenidol (二苯哌啶丁醇) | 0.14 | | | |

西藥成分188項 Western medicine (188)

(附件)

| 序號 | 分析項目 | M.D.L.
(mg/g) | 序號 | 分析項目 | M.D.L.
(mg/g) |
|------------|------------------------------|------------------|------------|---|------------------|
| 解熱止痛劑：(26) | | | 133 | Diltiazem (地尔硫卓) | 0.25 |
| 106 | Acemetacin (阿西美辛) | 0.2 | 134 | Dipyridamole (双嘧达莫) | 1 |
| 107 | Acetaminophen (对乙酰氨基酚) | 0.25 | 135 | Hydralazine HCl (盐酸肼苯哒嗪) | 2 |
| 108 | Acetylsalicylic acid (乙酰水杨酸) | 1 | 136 | Methyldopa (甲基多巴) | 0.25 |
| 109 | Aminopyrine (氨基比林) | 0.7 | 137 | Minoxidil (米诺地尔) | 0.25 |
| 110 | Benzylamine (苄达明) | 0.4 | 138 | Nifedipine (硝苯地平) | 0.5 |
| 111 | Bucetin (布西丁) | 0.25 | 139 | Pentoxifylline (己酮可可碱) | 0.25 |
| 112 | Bufexamac (丁苯羟酸) | 0.2 | 140 | Prazosin (哌唑嗪) | 1 |
| 113 | Diclophenac sodium (双氯芬酸钠) | 0.1 | 141 | Propranolol (普萘洛尔) | 1 |
| 114 | Dipyrone (安乃近) | 2 | 142 | Reserpine (蛇根碱) (蛇根碱) | 1 |
| 115 | Ethoxybenzamide (乙氧基苯甲酰胺) | 0.1 | 神經興奮劑：(7) | | |
| 116 | Fenbufen (芬布芬) | 0.25 | 143 | Caffeine (咖啡因) (咖啡因) | 0.25 |
| 117 | Flufenamic acid (氟芬那酸) | 0.4 | 144 | Ephedrine (麻黄素) (麻黄素) | 2.5 |
| 118 | Flurbiprofen (氟比洛芬) | 0.2 | 145 | Methylephedrine (甲基麻黄碱) | 1 |
| 119 | Ibuprofen (布洛芬) | 0.2 | 146 | Phenylephrine (福林) | 2 |
| 120 | Indomethacin (吲哚美辛) | 0.3 | 147 | Phenylpropanolamine (苯丙醇胺) | 4 |
| 121 | Ketoprofen (酮洛芬) | 0.18 | 148 | Theobromine (可可碱) (可可碱) | 1 |
| 122 | Mefenamic acid (甲芬那酸) | 0.25 | 149 | Theophylline (茶碱) (茶碱) | 0.13 |
| 123 | Methylsalicylate (水杨酸甲酯) | 0.04 | 肌肉鬆弛劑：(5) | | |
| 124 | Naproxen (萘普生) | 0.4 | 150 | Carisoprodol (卡立普多) | 10 |
| 125 | Niflumic acid (尼氟灭酸) | 0.35 | 151 | Chorazoxazone (氯唑沙宗) | 0.63 |
| 126 | Oxyphenbutazone (羟基保泰松) | 0.6 | 152 | Flavoxate (黄酮哌酯) | 0.25 |
| 127 | Phenacetin (非那西丁) | 0.2 | 153 | Mephensin (甲苯丙醇) | 0.13 |
| 128 | Phenylbutazone (保泰松) | 0.5 | 154 | Orphenadrine citrate (枸橼酸苯海拉明) | 0.25 |
| 129 | Piroxicam (吡罗昔康) | 0.4 | 支氣管擴張劑：(4) | | |
| 130 | Salicylamide (水杨酰胺) | 0.1 | 155 | Aminophylline (氨茶碱) (喘定) (喘定) | 3.38 |
| 131 | Sulindac (舒林酸) | 0.2 | 156 | Dihydroxypropyltheophylline (二羟丙茶碱) (喘定) (喘定) | 0.25 |
| 心臟血管類：(11) | | | 157 | Fenoterol (非诺特罗) | 4.25 |
| 132 | Atenolol (阿替洛尔) | 1 | | | |

西藥成分188項 Western medicine (188)

(附件)

| 序號 | 分析項目 | M.D.L. | 序號 | 分析項目 | M.D.L. |
|------------|-------------------------|--------|-----------------|---|---------|
| | | (mg/g) | | | (mg/ g) |
| 158 | Salbutamol (沙丁胺醇) | 1 | 173 | Benzbromarone (苯溴馬隆) | 0.25 |
| 鎮咳、祛痰劑：(7) | | | 174 | Colchicine (秋水仙鹼) | 0.25 |
| 159 | Becantex (雙丁茶磺鈉) | 8 | 175 | Probenecid (丙磺舒) | 0.25 |
| 160 | Bromhexine (溴己新) | 2 | 176 | Sulfinpyrazone (苯磺唑酮) | 0.25 |
| 161 | Cloperastine (氯哌斯汀) | 0.5 | 成癮性麻醉劑、禁用藥物：(6) | | |
| 162 | Dextromethorphan (右美沙芬) | 1 | 177 | Amphetamine (安非他命) | 1 |
| 163 | Guaifenesin (愈創甘油醚) | 0.13 | 178 | Fenfluramine (芬氟拉明) | 1 |
| 164 | Noscapine HCl (那可丁鹽酸鹽) | 1 | 179 | Heroin (海洛因) | 1 |
| 165 | Papaverine (罌粟鹼) (罌粟鹼) | 0.5 | 180 | Ketamine (K他命) | 1 |
| 局部麻醉類：(6) | | | 181 | Methamphetamine (甲基安非他命) | 1 |
| 166 | Benzocaine (苯佐卡因) | 0.13 | 182 | Phentermine (芬特明) | 0.25 |
| 167 | Dibucaine (辛可卡因) | 0.59 | 其他：(6) | | |
| 168 | Lidocaine (利多卡因) | 0.25 | 183 | Chlorhexidine (洗必泰) | 0.4 |
| 169 | Oxethazaine (奧昔卡因) | 0.25 | 184 | Methimazole (抗甲狀腺藥物) | 1.3 |
| 170 | Procaine (普魯卡因) | 5.81 | 185 | Mixed alkyltrimethylammonium bromide (混合烷基三甲基溴化物) | 0.8 |
| 171 | Tetracaine (丁卡) | 0.5 | 186 | Nicotine (尼古丁) | 0.4 |
| 痛風治療類：(5) | | | 187 | Podophyllotoxin (鬼臼毒素) | 0.2 |
| 172 | Allopurinol (別嘌呤醇) | 1 | 188 | santonin (山道年)-驅蟲劑 | 2.3 |